

**EML4-ALK V1  
[I1171T]/BaF3**

**CBP73353**

**操作说明书**



4008-750-250

## 目录

1. 背景信息 .....	1
2. 产品介绍 .....	1
3. 细胞基本信息 .....	2
4. 主要仪器试剂耗材 .....	2
5. 细胞培养 .....	3
5.1 细胞复苏 .....	3
5.2 细胞传代 .....	3
5.3 细胞冻存 .....	3
6. 细胞实验流程 .....	3
6.1 Anti-proliferation Assay .....	3
7. 数据展示 .....	5
7.1 增殖抑制实验验证结果 .....	5
7.2 Sanger 测序验证结果 .....	5
8. 相关产品 .....	5

## 1. 背景信息

EML4-ALK 融合基因定位于 2 号染色体的短臂上(2p21 和 2p23)，其 5' 端为 EML4 的片段，3' 端为 ALK 的片段，由倒置后的 EML4 基因片段与残余的 ALK 片段连接。ALK 和 EML4 的融合基因能够产生一种具有致瘤活性的融合蛋白即 EML4-ALK 融合蛋白，该蛋白由 EML4 的氨基末端与 ALK 的胞内近薄膜部分的激酶域结合所形成，EML4 的氨基末端部分对 ALK 激酶域的本构二聚作用，导致下游信号通路如 AKT,STAT3 和膜外信号调节激酶 1 和 2(ERK1/2) 的异常激活，使细胞增殖，永生化和骨架及外形的改变。ALK 的激活有助于细胞的生长、增殖、存活和迁移，而 EML4-ALK 融合基因中 EML4 激活 ALK 酪氨酸激酶区从而导致细胞的恶性增殖，引起癌变。EML4-ALK 融合基因由于断裂相接的位置不同存在多种亚型，目前至少发现了 20 多种 EML4-ALK 融合亚型，EML4 基因有很多断裂点，而 ALK 只有跨膜结构 N 端这一个融合位点，这些亚型中大多数都能够促进肿瘤形成。融合变异体对 EML4-ALK 抑制剂表现出不同的敏感性。其中 EML4-ALK 融合中最常见的变体亚型为 V1 和 v3a/b，约占所有 EML4-ALK 融合突变的 70%。V1 亚型是外显子 13 与 ALK 的外显子 20[E13; A20]长融合，V3a / b 亚型分别是 EML4 的外显子 6a / b 与 ALK 的外显子 20 短融合[E6a / b; A20]和[E6a / b; A20]短融合。各种 ALK 融合亚型的融合伴侣不同，表达形成的蛋白质构型也有不同，因此也导致了蛋白质稳定性及酪氨酸激酶活性差异。

## 2. 产品介绍

科佰生物推出 EML4-ALK V1 [I1171T]/BaF3 药靶细胞，其通过慢病毒转染的方法引入 I1171T 突变状态的 EML4-ALK V1 基因到 BaF3 细胞系中，稳定表达人突变形态下 EML4-ALK V1 [I1171T]基因。

Ba/F3（小鼠原 B 细胞）的生长和增殖需要 IL-3 的维持。引入各种表达激酶基因，这些基因能作为 Ba/F3 的驱动基因，让 Ba/F3 不再依赖 IL-3 而增殖，进而激酶基因成为 Ba/F3 增殖依赖的驱动基因，用于评估小分子药物对激酶的靶向抑制作用。




图 1: EML4-ALK V1 [I1171T]/BaF3 细胞构建流程

### 3. 细胞基本信息

母细胞: Ba/F3

表达基因: EML4-ALK V1 [I1171T]

传代培养基: RPMI-1640+10%FBS

细胞冻存液: 90% FBS+10% DMSO

细胞形态: 悬浮

支原体检测: 阴性

稳定性: 16 代 (室内测试结果, 不表示超过 16 代以上不稳定)

保存条件: 液氮保存

### 4. 主要仪器试剂耗材

名称	品牌	货号
EML4-ALK V1 [I1171T]/BaF3 完全培养基	Cobioer	CBP73353M
细胞冻存液	Cobioer	CBP50089
96 Well Assay Plate (White Plate, Clear Bottom with Lid Tissue Culture Treated Polystyrene 1/Pack)	Costar	3610
细胞活力检测试剂盒	Cobioer	CBPH0004

## 5. 细胞培养

### 5.1 细胞复苏

- 1) 在 37°C 水浴中快速融化细胞约 60 秒。一旦细胞解冻（可能比 60 秒稍快或稍慢），快速将冻存管中的细胞吸入装有 10 ml 预热 EML4-ALK V1 [I1171T]/BaF3 完全培养基的 15 ml 离心管中。
- 2) 1000 转、5 分钟离心细胞，除去培养基并将细胞重悬于 5 ml 预热的完全培养基中。
- 3) 调整细胞密度到  $3\text{-}6 \times 10^5 \text{ cells/ml}$ ，加入 T25 培养瓶中，放入 37°C、5% CO<sub>2</sub> 培养箱中。

### 5.2 细胞传代

每 1-2 天取细胞悬液计数，当密度大于  $2 \times 10^6 \text{ cells/ml}$  时，请及时传代或补加新鲜完全培养基。保持细胞密度在  $3 \times 10^5 - 2 \times 10^6 \text{ cells/ml}$  之间。

### 5.3 细胞冻存

取  $8 \times 10^6$  细胞离心后弃上清。加 1ml 细胞冻存液(90% FBS+10%DMSO)，吹打均匀，加入细胞冻存管。立即放入细胞冻存盒 (Nalgene 5100-0001)，加异丙醇到刻度线，放-80°C 冰箱。24 小时后将冻存管转到液氮中长期保存。

## 6. 细胞实验流程

### 6.1 Anti-proliferation Assay

此实验由药靶细胞 EML4-ALK V1 [I1171T] /BaF3 细胞,Cat. # CBP73353 展开，本实验使用 Crizotinib、TPX-0131、Lorlatinib 为测试样本，验证本模型的生物功能。




图 2: EML4-ALK V1 [I1171T]/BaF3 增殖抑制实验流程示意图

- 1) 取对数生长的细胞，离心弃培养上清，将离心下来的细胞重悬于新鲜 RPMI1640 培养基中，细胞密度为  $5 \times 10^4/\text{ml}$ 。
- 2) 将重悬的细胞接种到白壁透明底的 96 孔细胞培养板中， $100\mu\text{l}/\text{孔}$  细胞悬液，接种两块培养板，放置 37 度细胞培养箱 4 小时。
- 3) 取出其中一块接种细胞的 96 孔板，加入  $100\mu\text{l}/\text{孔}$  细胞活力检测试剂放置 30 分钟，读取数值，定义为 G0 数据。
- 4) 取另一块平行板，加入梯度稀释的  $10^*\text{浓度化合物 } 11.1\text{ }\mu\text{l}/\text{孔}$ ，化合物从  $10\mu\text{M}$  (96 孔板内  $1^*\text{最终浓度}$ ) 开始，3 倍稀释 9 个浓度梯度，并另外设置 DMSO 对照孔，继续在 37°C 细胞培养箱培养 72 小时。
- 5) 将化合物处理过 72 小时的 96 孔板从培养箱中取出，加入  $100\mu\text{l}/\text{孔}$  细胞活力检测试剂放置 30 分钟，读取数值，定义为 G3 数据。
- 6) 根据以下公式计算每个孔对应的细胞增殖率： $\text{Proliferation\%} = (\text{待测化合物孔 G3 平均值} - \text{G0 平均值}) / (\text{DMSO 对照孔 G3 平均值} - \text{G0 平均值}) * 100$ 。
- 7) 根据每个梯度浓度孔对应的增殖率和其浓度，利用 Prism Graphpad 软件拟合细胞增殖的梯度曲线，并且计算化合物的 GI50 (GI50 定义为细胞增殖率为 50% 时对应的化合物浓度)。

## 7. 数据展示

### 7.1 增殖抑制实验验证结果

CTG Proliferation Assay of BaF3 EML4-ALK V1 [I1171T] (C1)




图 3：使用 Crizotinib、TPX-0131、Lorlatinib 增殖抑制实验结果

### 7.2 Sanger 测序验证结果




图 4：一代测序验证基因突变（EML4-ALK V1 [I1171T]/BaF3 Fusion）




图 5：一代测序验证基因突变（I1171T）

## 8. 相关产品

EML4-ALK V1/BaF3	CBP73185
EML4-ALK V1 [C1156Y]/BaF3	CBP73189



EML4-ALK V1 [C1156Y/G1202R]/BaF3	CBP73364
EML4-ALK V1 [C1156Y/L1198F]/BaF3	CBP73351
EML4-ALK V1 [F1174L]/BaF3	CBP73188
EML4-ALK V1 [G1202R]/BaF3	CBP73200
EML4-ALK V1 [I1171T]/BaF3	CBP73353
EML4-ALK V1 [I1171S]/BaF3	CBP73354
EML4-ALK V1 [L1196M]/BaF3	CBP73187
EML4-ALK V1 [L1196M/L1198F]/BaF3	CBP73352
EML4-ALK V1 [L1198F]/BaF3	CBP73343
EML4-ALK V1 [D1203N]/BaF3	CBP73342
EML4-ALK V1 [G1202R/L1196M]/BaF3	CBP73271
EML4-ALK V1 [G1202R/L1198F]/BaF3	CBP73272
EML4-ALK V1 [G1202R/G1269A]/BaF3	CBP73273
EML4-ALK V1 [G1202R/G1269A/L1204V]/BaF3	CBP73339
EML4-ALK V1 [G1202R/G1269A/L1198F]/BaF3	CBP73340
EML4-ALK V1 [G1269A]/BaF3	CBP73341
EML4-ALK V1 [G1269S]/BaF3	CBP73350
EML4-ALK V1 [I1171N]/BaF3	CBP73299
EML4-ALK V1 [I1171N/F1174I]/BaF3	CBP73300
EML4-ALK V1 [I1171N/L1198H]/BaF3	CBP73301
EML4-ALK V3a/BaF3	CBP73199
EML4-ALK V3b/BaF3	CBP73186