

QKI-NTRK2 [G639R]/BaF3

CBP73261

操作说明书



4008-750-250

目录

1. 背景信息	1
2. 产品介绍	1
3. 细胞基本信息	2
4. 主要仪器试剂耗材	2
5. 细胞培养	3
5.1 细胞复苏	3
5.2 细胞传代	3
5.3 细胞冻存	3
6. 细胞实验流程	3
6.1 Anti-proliferation Assay	3
7. 数据展示	5
7.1 增殖抑制实验验证结果	5
8. 相关产品	5

1. 背景信息

QKI-NTRK2 融合基因是由 QKI 的外显子 1-6 (也称为蛋白震动) 与 NTRK2 的外显子 16-21 融合形成。由于存在整个 NTRK2 蛋白激酶结构域和所有关键的磷酸酪氨酸残基, QKI-NTRK2 可能激活所有下游 NTRK2 通路。QKI 是一种 RNA 结合蛋白, 可调节多个少突胶质细胞基因的表达, 并介导髓鞘形成的调节。此外, QKI 还参与许多与前 mRNA 剪接、mRNA 输出、蛋白质翻译、mRNA 保护和稳定相关的功能。令人惊讶的是, QKI 作为一种肿瘤抑制因子, 其对癌症相关基因(如 p27 和 β -catenin)的调节证明了这一点。QKI 功能障碍导致这些 mRNA 失调, 最终可能导致多种人类疾病, 包括肺癌、胶质母细胞瘤和神经系统疾病。QKI-NTRK2 融合保留了介导同源二聚化的 Qua1 结构域、参与 RNA 相互作用的 Qua2 结构域、KH RNA 结合结构域和 SH3 结合基序, 仅缺少编码 NLS 的 C 末端结构域。这种 NLS 的缺失可能导致异常定位和正常 QKI 功能的破坏, 从而导致融合蛋白 QKI-NTRK2 的致癌性。

2. 产品介绍

科佰生物推出 QKI-NTRK2 [G639R]/BaF3 药靶细胞, 其通过慢病毒转染的方法引入 G639R 突变状态的 QKI-NTRK2 基因到 BaF3 细胞系中, 稳定表达人突变形态下 QKI-NTRK2 [G639R] 基因。

Ba/F3 (小鼠原 B 细胞) 的生长和增殖需要 IL-3 的维持。引入各种表达激酶基因, 这些基因能作为 Ba/F3 的驱动基因, 让 Ba/F3 不再依赖 IL-3 而增殖, 进而激酶基因成为 Ba/F3 增殖依赖的驱动基因, 用于评估小分子药物对激酶的靶向抑制作用。




图 1: QKI-NTRK2 [G639R]/BaF3 细胞构建流程

3. 细胞基本信息

母细胞: Ba/F3

表达基因: QKI-NTRK2 [G639R]

传代培养基: RPMI-1640+10%FBS

细胞冻存液: 90% FBS+10% DMSO

细胞形态: 悬浮

支原体检测: 阴性

稳定性: 16 代（室内测试结果，不表示超过 16 代以上不稳定）

保存条件: 液氮保存

4. 主要仪器试剂耗材

名称	品牌	货号
QKI-NTRK2 [G639R]/BaF3 完全培养基	Cobioer	CBP73261M
细胞冻存液	Cobioer	CBP50089
96 Well Assay Plate (White Plate, Clear Bottom with Lid Tissue Culture Treated Polystyrene 1/Pack)	Costar	3610

细胞活力检测试剂盒	Cobioer	CBPH0004
-----------	---------	----------

5. 细胞培养

5.1 细胞复苏

- 1) 在 37°C 水浴中快速融化细胞约 60 秒。一旦细胞解冻（可能比 60 秒稍快或稍慢），快速将冻存管中的细胞吸入装有 10 ml 预热 QKI-NTRK2 [G639R]/BaF3 完全培养基的 15 ml 离心管中。
- 2) 1000 转、5 分钟离心细胞，除去培养基并将细胞重悬于 5 ml 预热的完全培养基中。
- 3) 调整细胞密度到 $3-6 \times 10^5$ cells/ml，加入 T25 培养瓶中，放入 37°C、5% CO₂ 培养箱中。

5.2 细胞传代

每 1-2 天取细胞悬液计数，当密度大于 2×10^6 cells/ml 时,请及时传代或补加新鲜完全培养基。保持细胞密度在 $3 \times 10^5 - 2 \times 10^6$ cells/ml 之间。

5.3 细胞冻存

取 8×10^6 细胞离心后弃上清。加 1ml 细胞冻存液(90% FBS+10%DMSO)，吹打均匀，加入细胞冻存管。立即放入细胞冻存盒（Nalgene 5100-0001），加异丙醇到刻度线，放-80°C 冰箱。24 小时后将冻存管转到液氮中长期保存。

6. 细胞实验流程

6.1 Anti-proliferation Assay

此实验由药靶细胞 QKI-NTRK2 [G639R]/BaF3 细胞,Cat. # CBP73261 开展，本实验使用 TPX-005、LOXO-101、LOXO-195 为测试样本，验证本模型的生物功能。




图 2: QKI-NTRK2 [G639R]/BaF3 增殖抑制实验流程示意图

- 1) 取对数生长的细胞，离心弃培养上清，将离心下来的细胞重悬于新鲜 RPMI1640 培养基中，细胞密度为 5×10^4 /ml。
- 2) 将重悬的细胞接种到白壁透明底的 96 孔细胞培养板中，100ul/孔细胞悬液，接种两块培养板，放置 37 度细胞培养箱 4 小时。
- 3) 取出其中一块接种细胞的 96 孔板，加入 100ul/孔细胞活力检测试剂放置 30 分钟，读取数值，定义为 G0 数据。
- 4) 取另一块平行板，加入梯度稀释的 10* 浓度化合物 11.1 ul/孔，化合物从 10uM (96 孔板内 1* 最终浓度) 开始，3 倍稀释 9 个浓度梯度，并另外设置 DMSO 对照孔，继续在 37°C 细胞培养箱培养 72 小时。
- 5) 将化合物处理过 72 小时的 96 孔板从培养箱中取出，加入 100ul/孔细胞活力检测试剂放置 30 分钟，读取数值，定义为 G3 数据。
- 6) 根据以下公式计算每个孔对应的细胞增殖率：
$$\text{Proliferation\%} = \frac{(\text{待测化合物孔 G3} - \text{G0 平均值})}{(\text{DMSO 对照孔 G3 平均值} - \text{G0 平均值})} * 100$$
- 7) 根据每个梯度浓度孔对应的增殖率和其浓度，利用 Prism Graphpad 软件拟合细胞增殖的梯度曲线，并且计算化合物的 GI50 (GI50 定义为细胞增殖率为 50% 时对应的化合物浓度)。

7. 数据展示

7.1 增殖抑制实验验证结果

CTG Proliferation Assay of BaF3 QKI-NTRK2 G639R (C1)




图 3: 使用 TPX-005、LOXO-101、LOXO-195 增殖抑制实验结果

8. 相关产品

QKI-NTRK2 [G639R]/BaF3	CBP73010
CSF3R T615A/BaF3	CBP73252
CSF3R T618I/BaF3	CBP73253
CSF3R Q741*/BaF3	CBP73254
CSF3R S783fs/BaF3	CBP73255